#### 大腸ポリペクトミーを受けられる方へ(1泊2日)

患者氏名(

) 主治医(

) 担当看護師(

	当日		1	
	術前		1日後	
達成目標	①不安が表出できる ②治療の目的を理解することができる ③合併症の内容を理解 できる	①痛みがない ②嘔気・嘔吐がない ③下血がない ④便の色が正常	<ul><li>①痛みがない</li><li>②嘔気・嘔吐がない</li><li>③下血がない</li><li>④便の色が正常</li><li>⑤退院が可能である</li></ul>	
注射	入院後、絶食のため点 滴を開始します。			
処置	便の排泄が不十分の 場合、浣腸処置を行い ます。			
検査			朝に採血があります。	
安静度	歩行可能です。内視鏡 室へは歩いて行きま す。	内視鏡室から車椅子で 部屋に戻ります。帰室 後歩行し可能ですが、 出血しやすいためでき るだけ安静にしてくださ		
食事/水分	絶食です。水・お茶は 飲めます。	絶食です。水・お茶は飲めます。	採血結果がよければ 朝食から食事が始まり ます。	
留置物	点滴針を留置します。	点滴終了後も針は留置したままで、翌朝の採 血の結果で問題がなければ抜きます。	採血結果問題なければ点滴の針を抜きます。	
観察	便の性状をお知らせく ださい。	検査後も便の性状をお知らせ下さい。 出血などある場合は流 さずトイレからナース コールでお知らせ下さい。		
薬剤	必要時に薬剤師より点滴、内服薬などについて説明します。持参薬がある場合、看護師へ提出してください。	是		
説明	処置の流れを説明します。承諾書を提出してく ださい。	腹痛や嘔気があれば、 すぐにお知らせ下さい。 不安な事や分からない 事があれば遠慮なく看 護師へお聞き下さい。	退院後の生活については、次のページをご覧下さい。 次回の外来受診日をお伝えします。	

# ~退院後の生活について~



## く食事>

退院後2週間は消化がよく軟らかいものを摂りましょう。固いものは出血を引き起こす原因となります。

また、刺激物も避けましょう。アルコールやタバコは基本的に2週間は禁止です。

### <入浴>

熱い湯・長風呂は出血の原因となりますので避けましょう。

#### <排泄>

便の状態を観察しましょう。

胃:黒っぽい便であれば出血の可能性があります。

腸: 赤っぽい便であれば出血の印です。

※上記のようなことがあれば病院に連絡をし状態をお伝えください。

三菱京都病院 消化器内科 2021年11月改訂