

がん種	レジメン名	投与期間	薬剤名	投与量	投与日	特記事項
乳がん	Abemaciclib	-	Abemaciclib	1回150mg 1日2回	連日	ホルモン受容体陰性かつHER2陰性症例 FULまたは非ステロイド性AI剤との併用 閉経前患者はFULにLH-RHf併用
	AC	3週間	DXR	80mg/m ²	day1	術前または術後化学療法の場合は4サイクル DXRの総投与量は500mg/m ² まで
	Atezolizumab/Nab-PTX	4週間	Atezolizumab Nab-PTX	840mg/body 100mg/m ²	day1 day1,8,15	PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性症例
	Capecitabine(A法)	4週間	Capecitabine	1回825mg/m ² 1日2回	day1-21	1.31m ² 未満:900mg/回、1.31m ² 以上~1.64m ² 未満:1200mg/回、1.64m ² 以上:1500mg/回
	Capecitabine(B法)	3週間	Capecitabine	1回1250mg/m ² 1日2回	day1-14	1.33m ² 未満:1500mg/回、1.33m ² 以上~1.57m ² 未満:1800mg/回、1.57m ² 以上~1.81m ² 未満:2100mg/回、1.81m ² 以上:2400mg/回
Capecitabine/Lapatinib	3週間	Capecitabine Lapatinib	1回1250mg/m ² 1日2回 1回1250mg 1日1回	day1-14 連日	2次治療以降 HER2陰性症例 Case 1.36m ² 未満:1200mg/回、1.36m ² 以上~1.66m ² 未満:1500mg/回、1.66m ² 以上~1.96m ² 未満:1800mg/回、1.96m ² 以上:2100mg/回	
CMF	4週間	CPA MTX 5FU	1回100mg/m ² 1日1回 40mg/m ² 600mg/m ²	day1-14 day1,8 day1,8	術前または術後化学療法の場合は4サイクル CPA 1.5m ² 未満:100mg/日、1.5m ² 以上:150mg/日	
Dose dense DTX	2週間	DTX	75mg/m ²	day1	4サイクル 若年者が対象 Pegfilgrastimを併用	
Dose dense EC	2週間	EPI CPA	90mg/m ² 600mg/m ²	day1 day1	4サイクル 若年者が対象 Pegfilgrastimを併用	
DTX	3週間	DTX	75mg/m ²	day1	術前または術後化学療法の場合は4サイクル	
DTX/HER	3週間	DTX HER	75mg/m ² 6mg/kg	day1 day1	HER2陰性症例 術前または術後化学療法の場合は4サイクル HER 初回及び投与予定日より1週間を超えた場合は8mg/kg	
DTX/HER/PER	3週間	DTX HER PER	75mg/m ² 6mg/kg 420mg/body	day1 day1 day1	HER2陰性症例 術前または術後化学療法の場合は4サイクル(再発リスクの高い症例) HER 初回及び前回投与日から6週間以上空いた場合は8mg/kg PER 初回及び前回投与日から6週間以上空いた場合は840mg/body	
DTX/HER/PER	3週間	DTX CBDDCA HER PER	75mg/m ² AUC=6 6mg/kg 420mg/body	day1 day1 day1 day1	HER2陰性症例 術前または術後化学療法として6サイクル(再発リスクの高い症例、アンスラサイクリン系抗がん剤を使用しない場合) HER 初回及び前回投与日から6週間以上空いた場合は8mg/kg PER 初回及び前回投与日から6週間以上空いた場合は840mg/body	
EC	3週間	EPI CPA	90mg/m ² 600mg/m ²	day1 day1	術前または術後化学療法の場合は4サイクル EPIの総投与量は900mg/m ² まで	
Eribulin	3週間	Eribulin	1.4mg/m ²	day1,8		
Eribulin/HER	3週間	Eribulin HER	1.4mg/m ² 6mg/kg	day1,8 day1	HER2陰性症例 HER 初回及び投与予定日より1週間を超えた場合は8mg/kg	
Eribulin/HER/PER	3週間	Eribulin HER PER	1.4mg/m ² 6mg/kg 420mg/body	day1,8 day1 day1	HER2陰性症例 HER 初回及び前回投与日から6週間以上空いた場合は8mg/kg PER 初回及び前回投与日から6週間以上空いた場合は840mg/body	
Everolimus	-	Everolimus	1回10mg 1日1回	連日	EXEと併用	
FEC	3週間	EPI CPA 5FU	100mg/m ² 600mg/m ² 500mg/m ²	day1 day1 day1	術前または術後化学療法の場合は4サイクル EPIの総投与量は900mg/m ² まで	
GEM	3週間	GEM	1250mg/m ²	day1,8		
GEM/HER	3週間	GEM HER	1250mg/m ² 6mg/kg	day1,8 day1	HER2陰性症例 HER 初回及び投与予定日より1週間を超えた場合は8mg/kg	
GEM/PTX	3週間	GEM PTX	1250mg/m ² 80mg/m ²	day1,8 day1,8		
GEM/PTX/HER	3週間	GEM PTX HER	1250mg/m ² 80mg/m ² 6mg/kg	day1,8 day1,8 day1	HER2陰性症例 HER 初回及び投与予定日より1週間を超えた場合は8mg/kg	
GEM/VNR	3週間	GEM VNR	1200mg/m ² 30mg/m ²	day1,8 day1,8		
HER	3週間	HER	6mg/kg	day1	HER2陰性症例 術前または術後化学療法の場合はタキサン系薬剤との併用も含め1年間 HER 初回及び投与予定日より1週間を超えた場合は8mg/kg	
HER/PER	3週間	HER PER	6mg/kg 420mg/body	day1 day1	HER2陰性症例 術前または術後化学療法の場合はタキサン系薬剤との併用も含め1年間(再発リスクの高い症例) HER/PER 初回及び前回投与日から6週間以上空いた場合はそれぞれ8mg/kgと840mg/body	
mPOX	1週間	Capecitabine CPA PTX	1回600mg/m ² 1日2回 50mg/body 80mg/m ²	連日 day1 day1	術前または術後化学療法 12サイクル	
Nab-PTX	3週間	Nab-PTX	260mg/m ²	day1		
Nab-PTX/HER	3週間	Nab-PTX HER	260mg/m ² 6mg/kg	day1 day1	HER2陰性症例 HER 初回及び投与予定日より1週間を超えた場合は8mg/kg	
Olaparib	-	Olaparib	1回300mg 1日2回	連日	がん化学療法後のあるBRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性症例	
Palbociclib	4週間	Palbociclib	1回125mg 1日1回	day1-21	ホルモン受容体陰性かつHER2陰性症例 FULまたは非ステロイド性AI剤との併用 閉経前患者はFULにLH-RHf併用	
S-1	6週間	S-1	1回40mg/m ² 1日2回	day1-28	1.25m ² 未満:40mg/回、1.25m ² 以上~1.5m ² 未満:50mg/回、1.5m ² 以上:60mg/回	
TAC	3週間	DTX DXR CPA	75mg/m ² 50mg/m ² 900mg/m ²	day1 day1 day1	術前または術後化学療法 6サイクル	
TC	3週間	DTX CPA	75mg/m ² 600mg/m ²	day1 day1	術前または術後化学療法 4サイクル	
T-DM1	3週間	T-DM1	3.8mg/kg	day1	HER2陰性症例 術後薬物療法は最大14サイクル	
T-DXd	3週間	T-DXd	5.4mg/kg	day1	HER2陰性症例 T-DM1投与歴あり	
UFT	-	UFT	1日300-600mg 1日2-3回	連日	術後化学療法の場合は2年間	
VNR	3週間	VNR	25mg/m ²	day1,8		
VNR/HER	3週間	VNR HER	25mg/m ² 6mg/kg	day1,8 day1	HER2陰性症例 HER 初回及び投与予定日より1週間を超えた場合は8mg/kg	
weekly PTX	1週間	PTX	80mg/m ²	day1	術前または術後化学療法の場合は12サイクル 進行・再発がんの場合は3週間を1サイクルとしてday1,8のみ投与するケースあり	
weekly PTX/BV	4週間	PTX BV	80mg/m ² 10mg/kg	day1,8 day1,8,15	HER2陰性症例	
weekly PTX/HER	3週間	PTX HER	80mg/m ² 6mg/kg	day1,8,15 day1	HER2陰性症例 術前または術後化学療法の場合は4サイクル 進行・再発がんの場合はPTXをday1,8のみ投与するケースあり HER 初回及び投与予定日より1週間を超えた場合は8mg/kg	
weekly PTX/HER/PER	3週間	PTX HER PER	75mg/m ² 6mg/kg 420mg/body	day1,8,15 day1 day1	HER2陰性症例 術前または術後化学療法の場合は4サイクル(再発リスクの高い症例) 進行・再発がんの場合はPTXをday1,8のみ投与するケースあり HER 初回及び前回投与日から6週間以上空いた場合は8mg/kg PER 初回及び前回投与日から6週間以上空いた場合は840mg/body	