

がん種	レジメン名	投与間隔	薬剤名	投与量	投与日	特記事項
食道がん	DTX	3週間	DTX	70mg/m ²	day1	2次治療以降
	FP	4週間	5FU	800mg/m ² (24hr)	day1-5	術前・術後化学療法の場合は3週間の投与間隔で2サイクル
			CDDP	80mg/m ²	day1	最大6サイクルまで
	FP+RT	4週間	5FU	700mg/m ² (24hr)	day1-5	RT:60Gy/30回
			CDDP	70mg/m ²	day1	有効性が確認された症例は追加化学療法としてFPを2サイクル追加
	5FU/NDP	4週間	5FU	800mg/m ² (24hr)	day1-5	術前・術後化学療法の場合は3週間の投与間隔で2サイクル
			NDP	90mg/m ²	day1	最大6サイクルまで
	5FU/NDP+RT	4週間	5FU	700mg/m ² (24hr)	day1-5	RT:60Gy/30回
			NDP	90mg/m ²	day1	有効性が確認された症例は追加化学療法として5FU/NDPを2サイクル追加
Nivolumab	4週間	Nivolumab	480mg/body	day1	フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤及びプラチナ製剤を含む併用化学療法に不応又は不耐な症例	
weekly PTX	4週間	PTX	100mg/m ²	day1,8,15	2次治療以降	